



CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
UNIÃO DA VITÓRIA (FUSA) – PARANÁ

CADERNO DE PROVAS

CARGO:

MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA



Antes de iniciar a prova, leia as instruções abaixo:

1. Espere a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul.
4. A folha de respostas compõe-se de quadrículas. Para assinalá-las, basta preencher toda a quadrícula da questão escolhida, da seguinte forma:
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o Fiscal comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Coloque somente seu número de inscrição; não coloque seu nome nem na folha de respostas, nem nas provas.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova acompanhado do fiscal de corredor.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o verso da ficha de comprovação de inscrição.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Os gabaritos estarão disponíveis no site da Uniuv: www.uniuv.edu.br, no dia 22/10.
18. O resultado do concurso será publicado na Imprensa Oficial e estará disponível no site da Uniuv, no dia 29/10.



1 - A atuação das equipes do PSF deve se fundamentar nos seguintes postulados. Indique a resposta correta:

- (A) Multiprofissionalidade da equipe e interdisciplinaridade.
- (B) Priorização das ações de saúde.
- (C) Interação dos profissionais de saúde com indivíduos sadios ou doentes, suas famílias e suas comunidades.
- (D) Somente A e C estão corretas.
- (E) As repostas A, B e C estão corretas.

2 - Assinale a resposta incorreta:

- (A) O PSF é centrado na vigilância à saúde.
- (B) O PSF trabalha com famílias inseridas em território de abrangência definido.
- (C) A equipe do PSF pode ser constituída de vários profissionais.
- (D) O PSF trabalha apenas com medicação fitoterápica.
- (E) O PSF mantém programas de atenção básica como Hipertensão, Tb, MH, puericultura, Pré-natal.

3 - A Lei Federal nº 8.142 (Lei Orgânica da Saúde), instituiu que o SUS contará, em cada uma das esferas do governo, com as seguintes instâncias colegiadas. Indique a correta:

- (A) Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Saúde Municipal.
- (B) Conferência de Saúde e Secretaria de Saúde.
- (C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (D) Secretaria do Bem estar Social e Conselho de Saúde.
- (E) Conselho de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente.

4 - A afirmação “Saúde é um direito de todos e dever do Estado” faz parte:

- (A) Da Constituição Federal no seu artigo 230.
- (B) Da Legislação Previdenciária no seu artigo 2º.
- (C) Da Constituição Federal em seu artigo 196.
- (D) As respostas A e C estão corretas.
- (E) As repostas B e C estão corretas.

5 - A abordagem sindrômica é importante, pois:

- (A) Tratando o portador estaremos acabando com o caso fonte.
- (B) Tratando o portador estaremos evitando que ele se reinfecte.
- (C) Diagnosticando, orientando, educando e tratando o portador de doenças infecto-contagiosas, estar-se-á trabalhando na prevenção dessas doenças.
- (D) Poderemos pedir todos os exames laboratoriais da atenção terciária.
- (E) Tratando o portador de doenças infecto-contagiosas, estaremos evitando a hospitalização.

6 - As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a prevenção e a cura. Devem atender o indivíduo como um ser humano integral. Essa afirmação reflete:

- (A) Integralidade;
- (B) Universalidade;
- (C) Equidade ;
- (D) As respostas A e C estão corretas;
- (E) As repostas B e C estão corretas.



7 - Na composição do Conselho de Saúde encontramos:

- (A) 25% de usuários, 50% de trabalhadores da Saúde e 25% prestadores de serviços públicos e privados.
- (B) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da Saúde e 25% de prestadores de serviços públicos e privados.
- (C) 50% de usuários, 35% de trabalhadores da Saúde e 15% de prestadores de serviços públicos e privados.
- (D) 25% de usuários, 25% de trabalhadores da Saúde e 50% de prestadores de serviços públicos e privados.
- (E) 50% de usuários, 40% de trabalhadores da Saúde e 10% de prestadores públicos e privados.

8 - As seguintes anormalidades são fatores de mau prognóstico na pancreatite (critérios de Ranson), exceto:

- (A) Diminuição importante no valor do hematócrito;
- (B) Hipocalemia;
- (C) Leucocitose;
- (D) Hiperglicemia;
- (E) Esteatorréia.

9 - Em paciente de sexo masculino, com 60 anos, que apresenta icterícia branda e perda de peso, com fosfatase alcalina muito elevada e fezes muito claras, o diagnóstico mais provável é:

- (A) Hepatite Viral;
- (B) Síndrome de Gilbert;
- (C) Cirrose do fígado;
- (D) Hepatite B;
- (E) Carcinoma pancreático.

10 - Anti-hipertensivo causador de broncoespasmo, redução da concentração de HDL colesterol e elevação de triglicérides no soro:

- (A) Captopril;
- (B) Hidralazina;
- (C) Propanolol;
- (D) Minoxidil;
- (E) Metildopa.

11 - No eletrocardiograma a presença de achatamento da onda T e ondas U proeminentes, pode ser considerado:

- (A) Hiponatremia;
- (B) Hipernatremia;
- (C) Hiperpotassemia;
- (D) Hipopotassemia;
- (E) Hipocalcemia.

12 - As seguintes condições cardíacas criam um risco relativamente alto de desenvolver endocardite bacteriana, exceto:

- (A) Defeito septal atrial;
- (B) Válvula cardíaca protética;
- (C) Coarctação da aorta;
- (D) Defeito septal ventricular;
- (E) Canal arterial persistente.



13 - No tratamento da Tricomoníase, devem ser utilizados:

- (A) Antibióticos de largo espectro;
- (B) Anti-inflamatórios;
- (C) Derivados sulfamídicos;
- (D) Aminoglicosídeos;
- (E) Derivados imidazólicos.

14 - O tratamento de Candidíase na gestação deve ser:

- (A) Tratado somente por via oral;
- (B) Só tratar se houver um intenso quadro de queixas;
- (C) Realizado apenas com creme via vaginal;
- (D) Deve ser tratado somente após o parto;
- (E) Não há necessidade de tratamento.

15 - A atividade física:

- (A) Diminui a atividade nervosa simpática, aumenta excreção urinária de sódio, diminui a insulina plasmática;
- (B) Aumenta a atividade da renina plasmática. Aumenta a insulina plasmática;
- (C) Diminui a excreção urinária do sódio;
- (D) Diminui a secreção de prostaglandina e aumenta excreção de sódio urinário;
- (E) Aumenta a insulina plasmática, aumenta atividade simpática.

16 - Na abordagem multiprofissional do paciente hipertenso, devem ser consideradas a seguintes estratégias, assinale a incorreta:

- (A) Reuniões com os pacientes;
- (B) Reuniões da equipe;
- (C) Desenvolvimento de ações comunitárias;
- (D) Atividades educativas;
- (E) Exames laboratoriais semanais.

17 - Como diferenciar clinicamente uma crise aguda de rinite alérgica de um quadro de rinossinusite ou rinite infecciosa?

- (A) A fotofobia é presente na rinossinusite;
- (B) A obstrução nasal na rinite alérgica é mais importante;
- (C) A cefaléia só está presente nos quadros com comprometimento dos seios paranasais;
- (D) Todas as anteriores;
- (E) Nenhuma das anteriores.

18 - Assinale a opção incorreta, nas manifestações da DRGE (Doença do refluxo gastroesofágico):

- (A) Epigastralgia;
- (B) Tosse;
- (C) Palpitação;
- (D) Pirose;
- (E) Dor retroesternal.



19 - No tratamento da infecção pelo *Helicobacter pylori*, deve-se considerar:

- (A) O teste respiratório de uréia e a pesquisa do antígeno fecal não estão indicados para controle da cura;
- (B) O controle do tratamento deve ser feito com testes sorológicos;
- (C) O uso de inibidores de bomba de prótons está contra-indicado em crianças;
- (D) O uso de Claritromicina, Amoxicilina e Omeprazol por 7-14 dias é considerado esquema de 1ª linha;
- (E) No retratamento deve-se repetir o esquema inicial, porém por um período mais longo.

20 - Em relação à Asma, qual o exame que pode auxiliar no diagnóstico/avaliação da resposta ao tratamento, pois permite medir o grau de limitação ao fluxo aéreo:

- (A) Rx de tórax;
- (B) Broncoscopia;
- (C) Espirometria;
- (D) Testes alérgicos;
- (E) Teste de escarro.

21 - Atualmente indique qual o medicamento de escolha para tratamento do controle da Asma:

- (A) Corticosteróide inalatório;
- (B) Anti-histamínico;
- (C) Antibióticos;
- (D) Sedativos;
- (E) Anti-inflamatórios não esteróides.

22 - Em crianças parasitadas por vários agentes, qual deve ser tratado em primeiro lugar:

- (A) *Ascaris lumbricóides*;
- (B) *Tênia*;
- (C) Amebíase;
- (D) *Trichuris trichiura*;
- (E) *Hymenolepis*.

23 - A taxa de natalidade de um país em determinado período é:

- (A) O nº de nascidos vivos e mortos por 1.000 habitantes;
- (B) O nº de nascidos vivos por 1.000 habitantes;
- (C) O nº de nascidos mortos e abortos por 1.000 habitantes;
- (D) Não há relação entre o indicador e os fatos;
- (E) Nenhuma das respostas anteriores.

24 - No exame neurológico do RN normal, devemos encontrar:

- (A) Moro presente;
- (B) Sucção presente;
- (C) Voracidade presente;
- (D) Todos eles;
- (E) Nenhum dos anteriores.



25 - Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta uma ou mais de uma das seguintes características:

- (A) Cefaléia persistente, boca seca e dermatite em mãos e pés, baciloscopia positiva.
- (B) Fotofobia, lesões descamativas de plantas dos pés e palmas das mãos.
- (C) Lesão ou lesões de pele com alteração da sensibilidade, acometimento de nervo(s) com espessamento neural, baciloscopia positiva.
- (D) Pigmentação na região das articulações falangianas, lesões em pápulas da face e mixedema generalizado.
- (E) Palidez, corrimento nasal mucoso, lesões descamativas de pele generalizadas, baciloscopia positiva.

26 - No tratamento da hanseníase, utiliza-se o esquema Paucibalar (PB) acondicionados em uma cartela, para pacientes com até 5 lesões de pele. Indique a opção correta:

- (A) Rifampicina, Minociclina e Ofloxacina;
- (B) Rifampicina, Dapsona, Ofloxacina;
- (C) Rifampicina, Clofazimina, Dapsona DDS;
- (D) Rifampicina, Dapsona;
- (E) Rifampicina, Clofazimina.

27 - É considerado “caso novo” de Tuberculose, o indivíduo que:

- (A) Teve contato com uma pessoa portadora de tuberculose;
- (B) Apresenta fatores de risco (DM, HI, MH, etilismo, tabagismo);
- (C) Pacientes que apresentam alterações pulmonares no RX de tórax;
- (D) Parentes que coabitam com portadores de tuberculose e têm baciloscopia negativa;
- (E) Paciente com tuberculose que nunca se submeteu a quimioterapia antituberculosa e/ou fez uso de tuberculostáticos por menos de 30 dias.

28 - A quimioprofilaxia da Tuberculose deve ser administrada quando:

- (A) A recém-nascidos, coabitantes de foco tuberculoso ativo não vacinados com BCG;
- (B) Pacientes etilistas sem reator forte à tuberculina;
- (C) Crianças menores de 15 anos, sem vacinação BCG, que tiveram contato com caso de Tb pulmonar bacilífera;
- (D) Apenas B e C estão corretas;
- (E) Apenas A e C estão corretas.

29 - Em paciente portador de AR (artrite reumatóide) quais critérios diagnósticos são verdadeiros?

- (A) Rigidez matinal (pelo menos por uma hora);
- (B) Artrite das articulações das mãos, nódulos reumatóides subcutâneos;
- (C) Artrite de 3 ou mais áreas articulares, fraqueza nas mãos;
- (D) Todas as anteriores;
- (E) Nenhuma das anteriores.

30 - Entre as enfermidades listadas abaixo, uma não se relaciona com a água:

- (A) Sarampo;
- (B) Hepatite;
- (C) Shigelose;
- (D) Dengue;
- (E) Leptospirose.